



**SANTA MARIA**  
LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS  
Y CENTRO DE IMAGEN



Laboratorio Certificado  
\* ISO 9001:2008  
0179/2008CRE00034



EMPRESA REGISTRADA  
NMX - CC/ISO 9000



BANCO DE CORDÓN UMBILICAL  
Tel. BCU: (01 771) 713 01 23

Sábado, 29 de enero de 2011

Dr. Manuel Ramírez Verduzco  
PRESENTE:

### TOMOGRAFIA CONTRASTADA DE ABDOMEN Y PELVIS

**Indicación clínica:** Irregularidad menstruación.

**Método:** Tomógrafo helicoidal, cortes axiales desde la base del tórax hasta el piso pélvico, antes y durante la administración de material de contraste endovenoso. Previa opacificación del tracto digestivo con contraste oral positivo.

**Descripción:**

El hígado tiene situación, morfología y dimensiones normales, no hay lesiones focales o difusas, ni dilatación de las vías biliares intra o extrahepáticas. La arteria hepática, las venas porta y hepáticas están permeables. Hay material quirúrgico en el lecho vesicular.

El páncreas tiene morfología y dimensiones normales, no hay dilatación el conducto pancreático principal. El bazo tiene morfología, densidad y dimensiones normales.

Ambos riñones tienen situación y morfología normales, concentran y eliminan de manera normal, el material de contraste endovenoso. Los uréteres tienen trayecto y calibre normales. Las glándulas suprarrenales tienen morfología y dimensiones normales.

El estomago y las asas de intestino delgado distienden de manera normal, el trayecto y calibre es normal, no hay defectos de llenado o masas aparentes. El colon tiene trayecto y calibre normal, no hay masas o defectos de llenado en el interior.

En la pelvis se observa al útero voluminoso con realce heterogéneo posterior a la administración de material de contraste, en la topografía del anexo derecho se observa una imagen ovoidea con densidad líquida probablemente en relación con folículo dominante.

La vejiga distiende de manera normal con compresión de la pared posterior por el útero, el recto y paredes laterales de la pelvis son normales.

La aorta y los troncos viscerales así como la vena cava tienen trayecto y calibres normales.

En lo observado del tórax no hay alteraciones.

**Conclusión:**

*Útero voluminoso con realce heterogéneo, considerar miomatosis uterina, se recomienda evaluación con ultrasonido endocavitario para una mejor caracterización.  
El resto de las estructuras evaluadas del abdomen son normales.*

Dr. Francisco J. Calvario G.  
Radiólogo DGP 4641706

Atentamente

Dr. Juan Pablo Vázquez O.  
Radiólogo DGP 4494651